

CÂNCER DE PULMÃO

TROPION LUNG 10

INDICAÇÃO:

Câncer de Pulmão não escamoso localmente avançado ou metastático PD-L1 $\geq$ 50% e sem alterações genômicas acionáveis

LINHA DE TRATAMENTO:

1ª Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Rilvegostomig +/- Dato-Dxd x Pembrolizumabe

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- CPNPC não escamoso documentado histológica ou citologicamente
- PD-L1 $\geq$ 50% (teste pelo estudo)
- Estágio IIIB / IIIC / IV
- ECOG 0-1
- Lesão alvo - RECIST 1.1
- Material da biópsia disponível (< 3 meses)

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepone@gmail.com

CÂNCER DE PULMÃO ARTEMIDE LUNG 02

INDICAÇÃO:

CPNPC escamoso com PD-L1 entre 1% e 49%

LINHA DE TRATAMENTO:

Primeira Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Rilvegostomig + carboplatina + paclitaxel X Pembrolizumabe + carboplatina e paclitaxel

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- PD-L1 $\geq$ 1%
- CPNPC escamoso em estágio clínico IV
- Apresentar doença mensurável com pelo menos 1 lesão-alvo com base em RECIST 1.1
- ECOG 0 – 1

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B ACRUE

INDICAÇÃO:

Idosos e/ou pessoas frágeis com linfoma difuso de grandes células B não tratados

LINHA DE TRATAMENTO:

Primeira Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Acalabrutinibe + Rituximabe SC

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- Diagnóstico de LDGCB
 - Idade ≥ 80 anos ou
- > 65-79 anos com comprometimento de:
- ≥ 1 ADL
 - ≥ 1 IADL ou Incapacidade de tolerar a CIT
- ECOG 0-2
 - Ann Arbor II-IV

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553
Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA QUANTUM-WILD

INDICAÇÃO:

Leucemia Mielóide aguda negativa para FLT3-IDT recém diagnosticada

LINHA DE TRATAMENTO:

Primeira Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Quizartinibe + QT X Placebo + QT

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- LMA sem mutação FLT3-IDT recém diagnosticada com condições para quimioterapia intensiva
- Negativo para FLT3-IDT definida como VAF < 5% (ou SR < 0,05)
- ECOG 0-2
- Apto a Iniciar QT "7+3" durante a triagem

Para encaminhar seus pacientes aos
nossos estudos, por favor, contate o
Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)98825-8130
ou contatopesquisa@cepon.org.br

MELANOMA

PRISM-MEL

INDICAÇÃO:

Participantes com melanoma estágio III ou IV, irressecável

LINHA DE TRATAMENTO:

Primeira Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

IMC-F106C + Nivolumabe X Nivolumabe

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- HLA-A* 02:01 positivo
- Melanoma avançado (irressecável ou metastático) não tratado previamente.
- ECOG 0-1
- status da mutação BRAF V600

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553
Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

Condrossarcoma CHONQUER

INDICAÇÃO:

Participantes com condrossarcoma convencional localmente avançado ou metastático com mutação IDH1, não tratado ou tratado anteriormente com um regime de tratamento sistêmico

LINHA DE TRATAMENTO:

1a/2a Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Ivosidenibe x placebo

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- CS convencional, Graus 1, 2 e 3
- Doença localmente avançada ou metastática
- Doença progressiva RECIST documentada
- 0 – 1 linha anterior de terapia sistêmica
- Mutação IDH1 (confirmada pelo teste central)
- ECOG 0 – 1
- Doença mensurável no período basal

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

CÂNCER GÁSTRICO OU JUNÇÃO GASTROESOFÁGICA DESTINY-Gastric 05

INDICAÇÃO:

Câncer gástrico ou adenocarcinoma de junção gastroesofágica, positivo para HER2 irressecável, localmente avançado ou metastático

LINHA DE TRATAMENTO:

Primeira Linha

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Trastuzumabe Deruxtecana + QT +/- Pembrolizumabe X QT +
+Trastuzumabe +/- Pembrolizumabe

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- Câncer gástrico ou adenocarcinoma de junção gastroesofágica localmente avançado ou metastático
- HER2 positivo (IHQ 3+ ou IHQ 2+ com ISH+)
- ECOG 0-1
- FEVE $\geq 50\%$

Para encaminhar seus pacientes aos
nossos estudos, por favor, contate o
Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)98825-8130
ou contatopesquisa@cepon.org.br

INDICAÇÃO:

Câncer de mama em estágio inicial com alto risco de recorrência

LINHA DE TRATAMENTO:

Adjuvante

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Elacestranto x Terapia endócrina padrão

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- Em vigência de hormonioterapia adjuvante há no mínimo 2 anos e no máximo 5 anos
- Linfonodo positivo na cirurgia curativa prévia
- Receptor de estrogênio positivo ($\geq 10\%$ por imuno-histoquímica)
- HER2 negativo
- ECOG 0-1
- Sem evidência de doença ativa

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)98825-8130
ou contatopesquisa@cepon.org.br

INDICAÇÃO:

Participantes com Câncer de Mama HR negativo /HER2- Low Metastático

LINHA DE TRATAMENTO:

2L/3L

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Trastuzumab - deruxtecan

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- Câncer de Mama HR-/HER2 low
- ECOG 0 – 1
- Pelo menos 1 linha de tratamento prévio no cenário paliativo
- Doença mensurável por RECIST 1.1
- Disponibilidade para biópsia ou material disponível < 3 meses

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

CÂNCER DE MAMA TROPION BREAST 5

INDICAÇÃO:

Participantes com Câncer de Mama Triplo Negativo metastático ou recorrente

LINHA DE TRATAMENTO:

1L

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Pembrolizumabe + QT x Durvalumabe + Datopotamab
Deruxtecan

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- Câncer de Mama triplo negativo = RH < 1%
- ECOG 0 – 1
- Doença mensurável por RECIST 1.1
- Disponibilidade para biópsia ou material disponível < 3 meses
- PD-L1 > 10% - teste central

Para encaminhar seus pacientes aos
nossos estudos, por favor, contate o
Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO EVOLVE CCP

INDICAÇÃO:

Participantes com Câncer de cabeça e pescoço localmente avançado

LINHA DE TRATAMENTO:

Adjuvante pós QT/RDT definitiva

MEDICAMENTO EM ESTUDO:

Observação x Volrustomig

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

- CEC de cabeça e pescoço
- ECOG 0-1
- inclusão em até 6 semanas após fim da QT/RDT
- Biópsia < 6 meses antes do início da QT/RDT e material disponível para avaliação de PD-L1
- Sem PD após tratamento

Para encaminhar seus pacientes aos
nossos estudos, por favor, contate o
Centro de Pesquisa, através do telefone
(48) 3331-1553

Whatsapp (48)99146-9566
ou pesquisaclinicacepon@gmail.com